

Essai de SURSEMIS dans prairie permanente, après campagnols

Le Mouret - 2011


Procédés

- 4 semoirs X 2 herse
- 1 mélange (à 20 kg /ha)
 - 50 g/are de ray-grass anglais AR ARARA
 - 120 g/are de ray-grass anglais mi-précoces LACERTA
 - 10 g/are de trèfle blanc petites feuilles PEPSI
 - 20 g/are de trèfle blanc grosses feuilles SEMINOLE
- dates de semis = 11 mars 2011

Semoirs


- Vredo : interligne = 7.5 cm (Alexandre 079 508 71 57)
- Sulky : interligne = 13.5 cm (Auguste 079 658 08 50)
- Aitchison : interligne = 15 cm (José 079 436 39 24)
- Einböck (Boschung = 079 746 38 54)
- Herse à disques Catros (Alexandre)

Plan



Résultats

Dans la mesure où tous les procédés ont bien fonctionné, il n'y a pas eu d'autres relevés que ceux de la levée.



Commentaires - Le Mouret

Les 4 semoirs ont permis une réussite de levée satisfaisante, et visible.

D'une façon plus précise, les semoirs à disques (Sulky, Vredo) ont permis une levée un peu plus rapide, et avec une couverture du sol un peu meilleure.

Il n'y a pas eu de différence de réussite de levée entre les 2 herse.

Les dégâts des campagnols étaient importants, ce qui a limité la concurrence de l'ancien gazon (la prairie avait reçu une fumure généreuse avant le sursemis). C'est une des conditions de réussite des sursemis, que la terre soit bien visible.

Pierre Aeby
Grangeneuve, le 27 janvier 2012